

Práctica 3:

Campos vectoriales e integrales de linea

Profesor: Cecilia Jarne (adaptada a partir de la práctica de Marcos Sirchia)

1. a) Calcular el gradiente de las siguientes funciones en los puntos indicados:

a) $f_1(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ desde $P_1(3, -4)$ a $P_2(0, 1)$

b) $f_2(x, y) = y$ desde $P_1(1, 1)$ a $P_2(-1, 2)$

c) $f_3(x, y, z) = x^2 + y^2$ desde $P_1(1, 1, 2)$ a $P_2(0, 1, 1)$

d) $f_4(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ desde $P_1(0, 3, 4)$ a $P_2(0, 0, 1)$

b) Hallar y graficar las curvas de nivel de las funciones de dos variables que pasan por los puntos indicados y hacer un esquema gráfico del gradiente en dichos puntos.

c) Hallar y graficar las superficies de nivel de las funciones de tres variables que pasan por los puntos indicados y hacer un esquema gráfico del gradiente en dichos puntos.

Ayuda: Recordar que $\vec{\nabla}f(x, y)$ es normal a la curva de nivel dada por $f(x, y) = \text{constante}$ y que $\vec{\nabla}f(x, y, z)$ es normal a la superficie de nivel dada por $f(x, y, z) = \text{constante}$.

2. a) Si $\vec{r}(t) = 3 \cos(2t)\hat{i} + 3 \sin(2t)\hat{j}$ representa la trayectoria de una partícula en el tiempo t , calcular la velocidad en el tiempo t y justificar que la velocidad de la partícula en un punto (x, y) de la trayectoria está dada por el campo vectorial $\vec{v}(x, y) = -2y\hat{i} + 2x\hat{j}$.

b) Si $\vec{v}_2(x, y, z) = 2\hat{i} + 3z\hat{j} + 2x\hat{k}$ representa la velocidad de un fluido, verificar que las trayectorias de las partículas que en el tiempo $t = 0$ se encuentran en el punto (x_0, y_0, z_0) está dada por la curva: $C : r_2(t) = (2t + x_0)\hat{i} + (2t^3 + 3x_0t^2 + 3z_0t + y_0)\hat{j} + (2t^2 + 2x_0t + z_0)\hat{k}$.

3. Dados los campos vectoriales siguientes:

a) $\vec{F}_1(x, y) = y\hat{i} - x\hat{j}$

b) $\vec{F}_2(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1}(y\hat{i} + x\hat{j})$

c) $\vec{F}_3(x, y) = xz\hat{i} - 2z\hat{j}$

d) $\vec{F}_4(x, y) = (x^2 + y^2)^{-1}\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

Hallar el dominio más amplio de cada uno de ellos y calcular la divergencia y el rotor. Indicar cuáles son solenoidales (eso significa $\text{div}\vec{F} = 0$ en todo su dominio) y cuáles son irrotacionales (eso significa $\text{rot}\vec{F} = 0$ en todo su dominio)

4. Sean f y g dos funciones escalares derivables y $\vec{F}$ es un campo vectorial derivable, probar las siguientes propiedades y expresarlas usando el operador nabla:

a) $\text{grad}(f \cdot g) = (\text{grad}(f)) \cdot g + f \cdot (\text{grad}(g))$

b) $\text{div}(f\vec{F}) = (\text{grad}(f)) \cdot \vec{F} + f \text{div}(\vec{F})$

c) $\text{rot}(f\vec{F}) = (\text{grad}(f)) \times \vec{F} + f \text{rot}(\vec{F})$

d) $\text{div}(\text{grad}(f))$ esta expresión se denomina Laplaciano de f y se indica como $\vec{\nabla}^2(f)$

5. Si $\vec{F}$ es un campo vectorial y f es una función escalar, determinar si cada una de las siguientes expresiones es un campo escalar, un campo vectorial o carece de sentido.

a) $\text{div}(\vec{F})$ b) $\text{grad}\vec{F}$ c) $\text{rot}f$ d) $\text{div}(\text{grad}(f))$

e) $\text{rot}(\text{rot}(\vec{F}))$ f) $\text{grad}(\text{div}(f))$ g) $\text{rot}(\text{grad}(f))$

h) $\text{grad}(\text{div}\vec{F})$ i) $\text{div}(\text{div}\vec{F})$ j) $\text{div}(\text{rot}(\text{grad}(f)))$

Integrales de linea:

6. Calcular $\int_C f \cdot dS$ en los siguientes casos:

a) $f(x, y, z) = x + z$, $C : r(t) = 2t\hat{i} + 3t^2\hat{j} + 3t^3\hat{k}$, con $0 < t < 1$

- b) $f(x, y, z) = 2x + 2y - 2z$, C es la intersección de $z = x^2 + y^2$ con el plano $z = 4$
- c) $(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1}$, $C : r(t) = 2 \cos(t)\hat{\mathbf{i}} + 2 \sin(t)\hat{\mathbf{j}} + 2t\hat{\mathbf{k}}$, con $t \in [0, 2\pi]$
- d) Calcular las integrales anteriores cambiando la orientación de la curva C y verificar que: $\int_C f \cdot dS = \int_{-C} f \cdot dS$
7. Calcular usando integrales de línea el área de las superficies cilíndricas S que se dan a continuación:
- a) $S : x^2 + y^2 = 4$, limitada por $z = 0$, $x + 3z = 6$
- b) $S : x^2 = y$, limitada por $z = 0$, $2x + y + 3z = 6$
8. Hallar la masa del alambre $9(x - 5/2)^2 + 25y^2 = 225$ con $x \gg 0$ si su densidad en cada punto es $f(x, y) = x|y|$.
9. Hallar el momento de inercia respecto del eje z del alambre $r(t) = \cos(t)\hat{\mathbf{i}} + \sin t\hat{\mathbf{j}} + 2t\hat{\mathbf{k}}$, $t \in [0, 2\pi]$, sabiendo que la densidad en cada punto es $f(x, y, z) = z$
10. Calcular $\int_C \vec{F} \cdot \vec{T} dS$ siendo:
- a) $\vec{F}(x, y) = 2xy\hat{\mathbf{i}} + x\hat{\mathbf{j}}$ y $C : x^2 + y^2 = 4$ desde $(2, 0)$ a $(0, 2)$ en el primer cuadrante.
- b) $\vec{F}(x, y, z) = x\hat{\mathbf{i}} + 2z\hat{\mathbf{j}} + y\hat{\mathbf{k}}$ y C es el segmento que une $(0, 0, 0)$ con $(1, 2, 3)$
11. Calcular el trabajo realizado por $\vec{F}(x, y, z) = y\hat{\mathbf{i}} + z\hat{\mathbf{j}} + xz\hat{\mathbf{k}}$ para mover una partícula que se desplaza desde el punto $A(0, 1, 2)$ hasta el punto $B(1, 1, 3)$ siguiendo los siguientes caminos:
- a) El segmento que une A con B.
- b) La poligonal que une A con $C(1, 1, 2)$ y este con $B(1, 1, 3)$.
- c) La curva $r(t) = t\hat{\mathbf{i}} + \hat{\mathbf{j}} + (t^3 + 2)\hat{\mathbf{k}}$ desde A hasta B.
- d) A partir de los resultados obtenidos, ¿puede decirse que el trabajo no depende del camino?